



Подготовка препаратом ЛАВАКОЛ **(исследование до полудня)**

За 2 дня до начала подготовки к исследованию - бесшлаковая диета.

Накануне исследования

7:00 Вместо завтрака выпить 1-2 стакана воды

Непосредственно после этого - **первая доза препарата Лавакол** (10 пакетов): каждый растворить в стакане воды, 1 стакан принимается в течение 15 минут отдельными глотками.

Между каждым литром (4 стакана) – перерыв 30 минут.

Через 30 минут после окончания приема препарата – 2 мерных колпачка сиропа эспумизана, разведенных в 0,5 стакана теплой воды.

13:00-14.00 Во время обеда нельзя употреблять никакой твердой пищи. Жидкостная диета: вода, процеженные бульоны, соки без мякоти, чай, кофе, негазированные напитки, питьевой йогурт без фруктов.

19:00 Вместо ужина выпить 1-2 стакана воды

Непосредственно после этого - **вторая доза препарата Лавакол** (5 пакетов): каждый растворить в стакане воды, 1 стакан принимается в течение 15 минут отдельными глотками.

Через 30 минут после окончания приема препарата – 2 мерных колпачка сиропа эспумизана, разведенных в 0,5 стакана теплой воды.

В день процедуры жидкость и пищу не принимать!

Эспумизан принести с собой и принять 1 мерный колпачок, не запивая водой, за 15 минут до исследования (в эндоскопическом отделении). Кроме того, на исследование принести с собой простыню, гель «Катеджель», ЭКГ (если процедура выполняется в условиях медикаментозного сна), имеющуюся медицинскую документацию, касающуюся ранее выполненных колоноскопий или перенесенных операций на толстой кишке, при необходимости - анализы крови.