



Подготовка препаратом ЛАВАКОЛ (исследование выполняется после полудня)

За 2 дня до начала подготовки к исследованию - бесшлаковая диета.

1 ВАРИАНТ (предпочтительный)

Накануне исследования:

Утром – бесшлаковая диета

13:00 – легкий обед. После обеда нельзя употреблять никакой твердой пищи. Жидкостная диета: вода, процеженные бульоны, соки без мякоти, чай, кофе, негазированные напитки, питьевой йогурт без фруктов.

19:00 Первая доза препарата Лавакол – 10 пакетов: каждый растворить в стакане воды, 1 стакан принимается в течение 15 минут отдельными глотками.

Между каждым литром (4 стакана) – перерыв 30 минут.

Через 30 минут после окончания приема препарата – 2 мерных колпачка сиропа эспумизана, разведенных в 0,5 стакана теплой воды.

В день процедуры

6:00 Вторая доза препарата Лавакол – 5 пакетов: каждый растворить в стакане воды, 1 стакан принимается в течение 15 минут.

Через 30 минут после окончания приема препарата – 2 мерных колпачка сиропа эспумизана, разведенных в 0,5 стакана теплой воды.

Если Вы **больны диабетом**, легкий завтрак (каша, яйцо, хлеб, чай или кофе) допустим в 7.30 и не помешает исследованию.

2 ВАРИАНТ – НАКАНУНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (более сложный)

Утром – бесшлаковая диета

С 16:00 - Лавакол – 15 пакетов: каждый растворить в стакане воды, 1 стакан принимается в течение 15 минут отдельными глотками. Между каждым литром (4 стакана) – перерыв 30 минут.

Через 30 минут после окончания приема препарата – 2 мерных колпачка сиропа эспумизана, разведенных в 0,5 стакана теплой воды.

Если Вы **больны диабетом**, легкий завтрак (каша, яйцо, хлеб, чай или кофе) в день исследования допустим в 7.00 и не помешает его проведению.

Эспумизан принести с собой и принять 1 мерный колпачок, не запивая водой, за 15 минут до исследования (в эндоскопическом отделении). Кроме того, на исследование принести с собой простыню, гель «Катеджель», ЭКГ (если процедура выполняется в условиях медикаментозного сна), имеющуюся медицинскую документацию, касающуюся ранее выполненных колоноскопий или перенесенных операций на толстой кишке, при необходимости - анализы крови.